



Dépister les séropositifs qui s'ignorent et
empêcher de nouvelles contaminations

**Evaluation de la faisabilité et de l'intérêt de
Test d'orientation et de Diagnostic (TROD)
pour l'infection à VIH et VHC pour la population
suivie au sein d'une PASS buccodentaire hospitalière**

A.Simon (1), F.Rilliard(2), A.Bouklhalfa(1), M. Saulnier(1), N.
Edeb(1), M. Laprevotte(1), E. Bernard(2), C. Naud Llamas
(2), F. Bourdillon(3)

(1) CDAG Hôpital Pitié Salpêtrière, Pole 3I

(2) Service d'odontologie, Hôpital Pitié Salpêtrière, Pole Chirurgie.

(3) Département de santé Publique, groupe hospitalier Pitié Salpêtrière Charles Foix, Pole santé publique, évaluation et
produits de santé





Plan National de lutte VIH et IST 2010-2014

Rapport MISSION RDRs


Prévention et réduction des risques dans les groupes à
haut risque vis-à-vis du VIH et des IST

Dr Yves Fassin (RDR)
Méd. Interne (RDR)
Méd. Infect. (RDR) - Ag. 01/11/2010

Dr Gilles KALICKI
Méd. Infect. (RDR) et Thérapeut.
Méd. Infect. (RDR)
Méd. Infect. (RDR) - Ag. 01/11/2010

En collaboration avec Gérard BORDO (RDR) et Olivier FORTIN (RDR) de l'Unité
Publique Pathologie (UPP)






Plan national de lutte contre le VIH/SIDA et les IST 2010-2014

Dépister précocement pour traiter plus tôt pour augmenter les chances thérapeutiques des personnes atteintes et limiter la diffusion de l'épidémie.

Chaque année, l'infection à VIH touche plus de 6000 personnes. On estime qu'en France, environ 40000 personnes, sur les 106000 à 134000 personnes séropositives pour le VIH, ignorent leur statut sérologique 1/3 arrive tardivement dans les soins

Chaque année, l'hépatite C touche 5 500 personnes supplémentaires. On estime à 250 000 le nombre de personnes porteuses du virus en France et à 150 000 celui de personnes infectées qui l'ignorent.



Plan national de lutte contre le VIH/SIDA et les IST 2010-2014

- **Mesure 1:**

Proposer dans le système de soin par les professionnels de santé de premier recours à la population générale un dépistage du VIH hors notion de risque d'exposition ou de contamination par le VIH.

- **Mesure 2:**

Offrir un dépistage ciblé et régulier du VIH pour certaines populations et/ou dans certaines circonstances.

- **Mesure 3:**

Réorganiser le dispositif actuel des CDAG/CIDDIST et créer un réseau de centres de santé sexuelle.

- **Mesure 4:**

Mettre en œuvre un dépistage en milieu communautaire.

- **Mesure 5:**

Améliorer le dépistage des IST.

- **Mesure 6:**

Renforcer les compétences des professionnels en matière de dépistage du VIH et des IST. banaliser le dépistage proposer aux professionnels des outils pour adapter leur proposition selon les personnes

- **Mesure 7:**

Améliorer le lien entre dépistage et prise en charge : dispositif d'accueil rapide et coordonné dans les services dans un contexte de "post-annonce" afin de rapprocher dépistage et soins.



Dépistage au sein du COREVIH Ile de France Centre

Extension du dépistage Hôpital Pitié-Salpêtrière

- Promotion du dépistage dans l'hôpital
 - Mise en place d'une semaine de dépistage autour du 1^{er} décembre
- Planning familial
 - Rapprochement entre le CDAG et le centre de planning (mise en place d'un fiche de liaison)
- Urgences
 - proposition du dépistage par TRODs en routine
- **PASS buccodentaire**



VIH - Hépatites
Pour moi... Pour les miens
Je **me** dépiste

Où se faire dépister ?

- J'en parle à mon médecin
- ou**
- Je vais au CDAG Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit de la Pitié Salpêtrière
Médecine Interne
- ou**
- Je vais au SMIT Service des Maladies Infectieuses et Tropicales (56 étage)
ou en consultations (36 étage)

corevih.idfcentre@pu.laphp.fr
www.corevih.idfcentre.org



Semaine du dépistage VIH

Où se faire dépister

J'en parle à mon médecin
ou
Je vais dans un CDAG du COREVIH
ou
Je vais dans un service de Maladies Infectieuses
ou
Je vais dans une association
ou
Je vais dans un centre de santé sexuelle

Service d'odontologie
CDAG de l'hôpital Pitié Salpêtrière
semaine du dépistage du 11 au 15 juin

Dépister, c'est prévenir se soigner.



Une infirmière
est présente
pour vous

l'infection à VIH
et des hépatites
par TROD

ASSISTANCE
PITIE-SALPETRIERE



corevih



**gratuit
et
anony
me !**

Extension du dépistage vers la PASS buccodentaire

Partenariats

Association SOS hépatites



Objectif et méthodes

- Objectif :
 - Améliorer la prévention et la qualité des soins par un dépistage précoce et adapté de l'infection à VIH/SIDA au sein d'une population de patients précaires

 - Promotion du dépistage par une délocalisation du dépistage du VIH et du VHC en contexte médicalisé « généraliste » d'une consultation d'odontologie. La consultation de la PASS buccodentaire n'est pas habituellement dévolue à ce type d'activité et le CDAG a proposé l'usage de TROD du VIH et du VHC permettant un accès simplifié au



Objectif et méthodes

□ Méthode

- Semaine test de dépistage par TROD organisée du 11 au 15 juin 2012
- Opération précédée par une semaine de sensibilisation avec information des objectifs et des modalités du dépistage avec remise d'une plaquette d'information
- Dépistage réalisé par les infirmières du CDAG détachées et formées à la réalisation du test rapide d'orientation diagnostique (TROD) et au counselling leur permettant de réaliser et rendre le résultat à chaque personne volontaire.
- Procédure de la consultation mise en place selon un protocole validé par les intervenants.
- Données sociodémographiques et sociales recueillies dans un dossier anonymisé.

□ Test utilisés = TROD

- Test VIH INSTITM de bioLytical™ Laboratories
- Test VHC OraQuick®



RESULTATS

77 personnes avaient RDV à la consultation buccodentaire la semaine de dépistage

13 personnes ne se sont pas présentées

21 ont refusé le test

- 6 sans motif

- 3 évoquent une indisponibilité de temps

- 4 avaient déjà une pathologie VIH ou VHC déjà suivie

- 4 avaient fait un dépistage récent

- 2 avaient peur de savoir

- 1 avait des problèmes de compréhension

- 1 ne se sentait pas concerné

43 dépistages ont été réalisés par TROD VIH/VHC



RESULTATS

43 dépistages réalisés

55 % hommes

âge moyen 46 ans

Pays d'origine Etranger 80 % dont 55 % Afrique, 16 % Europe de l'est
7 % Amérique du sud

Pas de VIH+ dépisté

3 VHC+ soit 7 %

diagnostic inconnu des personnes dépistées,

Test confirmé par sérologie sur plasma

Prise en charge dans une structure de soins



Discussion/conclusion

Cette extension du dépistage a montré

- la faisabilité et l'acceptabilité d'un dépistage par TROD dans une consultation PASS.
- L'efficacité sur ce petit échantillon de population puisque une positivité VHC est retrouvée chez près de 7 % de sujets
- la possibilité d'un partenariat entre une structure CDAG et une consultation de premiers soins

Le projet est de pérenniser une proposition de TRODs en pratique courante par les personnels de la PASS avec relai avec le CDAG