

Les dispositifs de dépistage

IXe Congrès national de la Société Française de Lutte contre le Sida - 24 Octobre 2008

Caroline Semaille, Françoise Cazein, Florence Lot, Stéphane Le Vu, Josiane Pillonel, Roselyne Pinget, Annie Velter, Jean-Claude Desenclos

Unité VIH-IST-VHC-VHB chronique, Département des maladies infectieuses, Institut de Veille Sanitaire





Comment surveiller le dépistage en France ?

.....plusieurs sources sont nécessaires

- Surveillance des activités de dépistage à partir des laboratoires publics et privés (Réseau LaboVIH)
- Surveillance des activités de dépistage dans les CDAG (environ 300 structures)
- Surveillance des comportements de dépistage grâce à des enquêtes répétées dans le temps
 - En population générale (KABP/ORS, Baromètre Santé/Inpes, enquête CSF/Inserm Ined, ANRS)
 - Dans des populations spécifiques : migrants (KABP/Inpes), homosexuels (EP Gay/InVS, ANRS, Baromètre Gay), usagers de drogues (Coquelicot InVS/ANRS)
 - Dans les CDAG (enquêtes InVS 2000 et 2004)



Une activité globale qui a augmentée depuis 2001





- 4 300 laboratoires
- 5 millions [4.96 - 5.10] de sérologies réalisées dont $\frac{3}{4}$ en ville, 8% dans les CDAG
- 10 600 sérologies confirmées positives [10200-11000] dont 39% en ville et 12% réalisées en CDAG
- 2,1 sérologies positives pour mille hab.

Réseau LaboVIH 2007, InVS



Une activité globale qui a fortement augmentée depuis 2001 dans les CDAG



— Tests — % Total —△— % Hommes —○— % Femmes

- 300 CDAG
- 357 000 personnes accueillies
- 305 000 sérologies
- 1200 sérologies positives
- 3,9 positifs pour mille
 - 3,1 ‰ femmes
 - 4,6 ‰ hommes

Surveillance des CDAG 2006, InVS



Quel est le profil des consultants des CDAG ?


Enquête « profil des consultants » InVS, 2004

- La plupart des sites ont participé (198 sites, 82 % de l'activité)
représentant 5398 consultants dont 34% en Ile-de-France
- Une population qui est jeune :
Moitié d'hommes et moitié de moins de 25 ans
- Des CDAG qui a attiré des populations différentes en 2004 (/enquête de 2000)
 - Plus d'étrangers (8%, soit une augmentation de + 66 % entre 2000-2004)
 - Des personnes déclarant des relations homosexuelles plus nombreuses (18 % de relations homosexuelles, + 27% entre 2000-2004)



Des motifs de tests différents en fonction de l'origine géographique

Motifs du test selon l'origine chez les femmes




Source : enquête profil des consultant 2004, InVS



Des motifs de tests différents en fonction de l'orientation sexuelle

Motifs du test selon l'orientation sexuelle chez les hommes




Source : enquête profil des consultant 2004, InVS



Des prévalences des tests VIH+ plus élevées selon les groupes

Prévalence test VIH+





Source : enquête profil des consultant 2004, InVS



Des disparités régionales existent en matière d'activité de dépistage

Taux de sérologies pour 1000 hab.


Taux de positifs par millions d'hab.





Des disparités que l'on retrouve au niveau européen : la France a un des taux de dépistage le plus élevé

Taux de tests réalisés par habitants en Europe Source : EuroHIV 2005



En 2006, les pays ayant réalisé plus de 50 tests/1000 hab. sont dans l'ordre :
Fédération de Russie (130), Kazakhstan (58), Autriche (80), France (80),
Belgique (55)



Quels sont les comportements de dépistage? En population générale

Source : Enquête baromètre santé 2005 Inpes


- Enquête baromètre santé de l'Inpes (2005) auprès des personnes de 15 à 54 ans : les femmes sont plus nombreuses à avoir réalisé un test de dépistage (surtout chez les <20 ans et 25-34 ans), 30 000 personnes interrogées
 - 12% des hommes ont fait un test dans les 12 derniers mois
 - 14% des femmes ont fait un test dans les 12 derniers mois



Quels sont les comportements de dépistage? En population générale

Source : Enquête KABP ORS IDF 2004

Le recours au dépistage dans les 12 derniers mois est stable depuis 1998




Enquêtes réalisées auprès d'échantillons de 1200 à 3000
en fonction des années



Quels sont les comportements de dépistage? Chez les usagers de drogues

Source : Enquête Coquelicot 2004 InVS/ANRS

- 95 % des UD se sont dépistés au cours de leur vie
- 2% des UD se croient à tort séronégatifs pour le VIH



N= 1500 UD



Quels sont les comportements de dépistage? Chez les personnes migrantes


Source : Enquête KABP 2005 Inpes

- Réalisation d'une enquête auprès de 1800 personnes migrantes dans 50 communes d'IDF tirées au sort parmi 325 communes
- Inclusion des sujets âgés de 18-49 ans, nés en Afrique subsaharienne
- Passation d'un questionnaire dans les gares de RER, marché, centres commerciaux et la poste
- Résultats : 65% des migrants ont fait au moins un test au cours de leur vie (80% chez les plus de 35 ans)




Un recours au dépistage qui augmente avec l'âge des migrants

Source : Enquête KABP 2005 Inpes



Hommes




Femmes



Quels sont les comportements de dépistage? Chez les homosexuels

Source : Enquête Presse gay 2004 InVS/ ANRS

- Ceux qui n'ont jamais eu recours au test sont plus souvent < 20 ans et > 45 ans, bisexuels, n'ont pas suivi d'études supérieures
- Ceux plus distants vis-à-vis d'un certain mode de vie homosexuelle (fréquentation des lieux de sexe, multipartenariat) déclarent plus souvent n'avoir jamais eu recours au test
- 48% ont été testé dans les 12 derniers mois



Avoir eu recours au test de dépistage au cours de la vie



Aucun recours au test



Quels sont les comportements de dépistage? Chez les homosexuels

Source : Enquête Presse gay 2004 InVS/ ANRS

Une fréquence de dépistage VIH élevée

- Les trois-quarts des HSH ont effectué un test dans les 2 dernières années
- Nombre moyen de tests effectués au cours des 2 dernières années est de 2.8 [1 – 30] tests.
- Prés d'un tiers des répondants testés ont réalisé > 3 tests



Synthèse

- Une forte activité de dépistage en France
- Des comportements vis à vis du dépistage qui diffèrent en fonction des populations mais un « recours » au dépistage qui est globalement assez élevé
- Malgré cela, il persiste des retards au dépistage :
 - 17% des personnes qui découvrent leur séropositivité en 2007 sont au stade sida
 - 25% des personnes nouvellement pris en charge à l'hôpital pour le VIH ont un taux de CD4 < 200 ou un sida en raison d'un dépistage trop tardif